

25 - 64歲

曾有性經驗的婦女應定期接受

子宮頸篩查

無症狀?

收咗經?

無家族病史?


太忙?

打咗子宮頸癌疫苗?

怕尷尬?

都要做篩查

子宮頸癌



子宮頸癌是香港女性中常見的癌症。

大部分子宮頸癌是由於持續感染致癌(或高風險類型)的人類乳頭瘤病毒(又稱HPV)所致。



HPV感染一般出現在曾經有性生活的人士。



大部分受HPV感染的人士沒有任何症狀，而且可自行清除病毒。



有部分女性卻因持續感染高風險類型的HPV而導致子宮頸細胞出現病變。這些病變大多會回復正常，但部分可能會在數年間發展成為癌症。

引致HPV感染或子宮頸癌的風險因素

1. 有多個性伴侶
2. 過早開始有性行為
3. 同時感染性病
4. 吸煙
5. 免疫能力減弱
6. 長期服食避孕丸超過五年(但停止服藥十年以上風險會回復正常)
7. 多次生育或第一次懷孕時年齡較輕

儘管上述的風險因素，定期接受子宮頸篩查，及早發現和治療早期的子宮頸細胞癌前病變，能預防子宮頸癌。

預防子宮頸癌



定期接受子宮頸篩查
已獲證實為有效預防子宮頸癌的方法。




其他預防措施

- 未曾有性行為時接種 HPV 疫苗
- 採取安全性行為
- 不要吸煙

子宮頸篩查

子宮頸篩查是一種快捷而簡單的測試。



進行篩查的時候，醫生或護士會將一個窺器放進女性的陰道內，然後用刷子於子宮頸的表面位置抽取樣本，再送到化驗室檢驗。

癌症預防及普查專家工作小組篩查建議

25 至 64 歲而曾有性經驗的婦女，都應該定期接受子宮頸篩查

癌症預防及普查專家工作小組篩查建議

一般風險的無症狀婦女

25 至 29 歲

而曾有性經驗的婦女，若連續兩年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每三年接受一次篩查

30 至 64 歲

而曾有性經驗的婦女，應接受以下任何一種的篩查方法：

- (i) 若連續兩年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每三年接受一次篩查；或
- (ii) 每五年接受一次 HPV 檢測；或
- (iii) 每五年接受一次 HPV 檢測與子宮頸細胞檢驗的合併檢測

65歲或以上

而曾有性經驗的婦女：

- ▶ 如在過去10年的常規篩查均得出正常結果，可停止接受篩查
- ▶ 如從未接受子宮頸篩查，應接受篩查

較高風險的婦女

- ▶ **21 至 24 歲**而曾有性經驗的婦女，如有感染/持續感染 HPV 或患子宮頸癌的風險因素，會被視為較高風險人士。她們應按照醫生的評估和建議接受篩查
- ▶ **其他患子宮頸癌風險較高的婦女**須由醫生評估，並可能須接受較頻密的篩查

子宮頸普查計劃

政府和醫護界別合作推廣子宮頸篩查，鼓勵婦女定期進行子宮頸篩查，以預防子宮頸癌。



子宮頸普查資訊系統 (www.csis.gov.hk)

建立子宮頸普查資訊系統(系統)是為了讓醫療服務提供者能夠互通資料。系統是儲存和處理相關資料的中央電子資料庫，當中包括參加者的個人資料、篩查結果及建議的覆檢日期等。

登記子宮頸普查資訊系統

- 1 網上登記
www.csis.gov.hk*; 或
- 2 郵寄表格*; 或
- 3 經由已登記系統的服務提供者登記



收到帳號啟用碼及授權代號

- 利用帳號啟用碼啟用你的系統帳號
- 利用授權代號授權你的服務提供者查閱篩查紀錄

登入子宮頸普查資訊系統

- 查閱你的篩查紀錄及建議的覆檢日期

*請將香港身份證/護照副本郵寄到子宮頸普查計劃辦事處。

登記子宮頸普查資訊系統後，你可以：

- 👍 查閱你已提交的篩查紀錄
- 👍 透過電郵、短訊或郵寄方式收到下次篩查的提示
- 👍 授權你所選擇的服務提供者查閱篩查紀錄，以便提供持續及有連貫性的跟進服務

哪裡接受篩查

在本港，家庭醫生、婦科醫生、非政府機構、衛生署的母嬰健康院及婦女健康中心都有提供子宮頸篩查服務。請聯絡你所選擇的服務提供者預約子宮頸篩查。

已登記子宮頸普查資訊系統的服務提供者：
www.cervicalscreening.gov.hk/tc/serviceproviders.html

有關預約母嬰健康院子宮頸篩查服務，可致電子宮頸普查服務 24 小時預約及資訊熱線 **3166 6631**。

子宮頸普查計劃
www.cervicalscreening.gov.hk

